

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目薬

ROHTO

EYE DROPS・12mL 第2類医薬品

Z!

Refresh Your Eyes.

最高級*の爽快感をもつマルチ機能性目薬。

酷使した目のつらい疲れに。

(*当社製品内で最も高い清涼感レベル)

"Wow, what a feeling!" "Strong yet soft, the indescribable sensation is truly long lasting."
"The sensation spreads through my brain—I feel wide awake. My eyes are purified and refreshed." — It's "ROHTO Z!". Feel it!

PRO

販売名：ロートジ®プロb

特長

こだわり機能 ①

● 最高級*の超清涼感へのこだわり

ロート製薬の目薬の中で最も高い清涼感レベルを実現。つき抜ける爽快感。

こだわり機能 ②

● 瞳にしっかりビタミン補給

ビタミンB6を基準内最大濃度配合（一般用眼科用薬製造承認基準内の最大濃度）

● ピント調節機能を回復

ネオスチグミンメチル硫酸塩が凝り固まった目の疲れをほぐす

● 充血除去・抗炎症・ヒスタミンをブロック

塩酸テトラヒドロゾリン、アラントイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩配合

● 細胞呼吸を促進する

L-アスパラギン酸カリウム配合。

こだわり機能 ③

● フリーアングルノズル®

いつでも、どこでも、
スムーズに点眼できるノズル採用。

"Z!(ジー)"したい時、簡単にアイケア
できて、とっても便利です。



自由な角度で点眼 OK!

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人・・・はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人・・・緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用のみ使用してください。

容器の先と



目やまつ毛がふれることのないように

成分

塩酸テトラヒドロソリン・・・・・・・・・・0.05%	クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・0.03%
ネオスチグミンメチル硫酸塩・・・・・・・・0.005%	ビタミンB ₆ ・・・・・・・・・・・・・・・・0.1%
アラントイン・・・・・・・・・・・・・・・・0.2%	L-アスパラギン酸カリウム・・・・・・・・・・1%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-カンフル、ペパーミントオイル、ハッカ油、プロピレングリコール、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒプロメロース、ブドウ糖、クロロブタノール、pH調整剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



キャップの開閉方法



キャップの開け方
キャップを手前にひねってください。



キャップの閉め方
カチッと音がするまで押し下げてください。

※容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだし、もれることがあります。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけます。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間9：00～18：00（土、日、祝日を除く）